

# ФОРТРАНС® (FORTRANS®)

Beaufour Ipsen Pharma A06A D65

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

**пор. д/п р-ра д/перор. прим. 73,69 г пакетик, № 4 71,99 грн.**

Макрогол 4000	64 г
Натрия сульфат безводный	5,7 г
Натрия бикарбонат	1,68 г
Натрия хлорид	1,46 г
Калия хлорид	0,75 г
Прочие ингредиенты: натрия сахаринат.	

№ UA/6620/01/01 от 26.06.2007 до 26.06.2012

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:** за счет образования водородных связей с молекулами воды Фортранс удерживает ее в кишечнике. Вода разжижает содержимое кишечника и увеличивает его объем, оказывая слабительный эффект. Препарат полностью эвакуируется из кишечника вместе с его содержимым. Действие кишечника начинается через 1–1,5 ч и продолжается в течение 2–5 ч. В случае двукратного приема Фортранса опорожнение кишечника начинается при повторном приеме утром через 20–30 минут. Фортранс не всасывается и не метаболизируется в организме, выводится в неизменном виде.

**ПОКАЗАНИЯ:** лаваж кишечника для подготовки к проведению эндоскопических и рентгенологических исследований, хирургических вмешательств на кишечнике.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** назначают взрослым. Содержимое каждого пакетика растворяют в 1 л воды. Дозирование проводится из расчета около 1 л р-ра на 15–20 кг массы тела. Обычно количество р-ра для процедуры составляет 3–4 л. Один стакан р-ра рекомендуется выпить в течение 15 мин, 1 л р-ра — за 1 ч. Р-р принимают вечером, если процедуры запланированы на утро, или в течение следующего дня, но с таким расчетом, чтобы прием препарата был закончен за 3 ч до проведения процедуры.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые нарушения общего состояния пациента, такие как дегидратация организма или тяжелая сердечная недостаточность; пациентам с распространенной карциномой или любым заболеванием кишечника, которое сопровождается повреждением слизистой оболочки (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит); кишечная непроходимость; возраст до 15 лет (в связи с отсутствием опыта применения в педиатрической практике).

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:** в начале применения отмечаются тошнота и рвота, проходящие при дальнейшем лечении; иногда — метеоризм. Редко отмечаются аллергические кожные реакции: сыпь, крапивница, отеки.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:** ослабленным лицам пожилого возраста препарат следует принимать под контролем врача. Фортранс не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а также лицам, из рациона которых исключается галактоза. Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:** замедляет абсорбцию в кишечнике препаратов, назначаемых сочетанно, поэтому не рекомендуется принимать другие лекарственные средства во время приема препарата.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА:** диарея. Лечение симптоматическое.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** хранить при температуре не выше 30 °С.